



服用碘片（G. L. Pharma 碘化钾 65 毫克片剂）

发生辐射事故时，碘片可用于防止释放到空气中的放射性碘（碘的放射性同位素）在摄入或吸入后沉积于甲状腺内。在发生辐射危险的情况下使用碘片可以减少甲状腺癌的风险。

只有当局发出关于用药通知后方可服用碘。用药授权通知将通过广播、电视或其他官方通讯宣布。

药品不得用作预防措施进行服用

本包装含 10 片。请勿超过该剂量。仅服用一剂。当局可能会建议您之后再服用第二剂。然而，不建议新生儿、孕妇或哺乳期妇女服用第二剂。

针对不同年龄组和孕妇的碘片剂量如下所示：

（只适用于 65 毫克片剂）

年龄	剂量	65 毫克片剂数量	图片
1 个月以下婴儿	16.25 毫克	$\frac{1}{4}$ 片剂	
1 个月-2 岁	32.5 毫克	$\frac{1}{2}$ 片剂	
3-11 岁儿童	65 毫克	1 片	
12-40 岁人群和孕妇	130 毫克	2 片	

40 岁以上的人士无法从碘中获益（不包括孕妇）。

碘片也可以碾碎或咀嚼。为了方便服药，您可以用勺子把碘片压碎，比如说，将其溶解在少量的水、牛奶或果汁中。药品可能需要数分钟的时间才能溶解。

若遇下述情况，请勿服用碘片：

- 您的甲状腺已被切除或失用（碘不起作用）。
- 您此前对碘出现严重过敏反应
- 您患有甲亢、疱疹性皮炎或补体水平降低下的脉管炎（低补体性脉管炎）。

将药片置于儿童无法接触的地方。如果您的孩子有两处住所，建议在两处住所都存放药片。

